

感染症一覧表

病名	潜伏期	出席停止期間	登園許可証	感染経路
				伝染
麻疹(はしか)	9～12日	主要症状消失まで(約10日)	提出	飛沫感染・空気感染 発病後3～4日から発疹がでてくるまでが最も強い
風疹	14～20日	発疹が消失するまで停止(5～7日)	不要	飛沫感染 発疹出現の前後7日間
水痘(水ぼうそう)	14～16日(2～3週)	全ての発疹がかさぶたになるまで(1～2週間)	提出	飛沫感染・接触感染・空気感染 発疹の1日前から、かさぶたになるまでが感染期間
突発性発疹	5～15日	病状により医師の指示による	不要	唾液感染
百日咳	7～10日	特有の咳が消失するまで(約4週間)	提出	飛沫感染 せきが出てから4週間
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	9～30日(平均17日)	耳下腺の腫脹が消失するまで	提出	飛沫感染 明らかな症状を示す7日前から9日間続く
結核		主症状が消失し、医師が登園しても差し支えないと認めるとき	提出	飛沫感染・空気感染
SARS		主症状が消失し、医師が登園しても差し支えないと認めるとき	提出	飛沫感染・接触感染・空気感染
手足口病	3～7日	病状により医師の指示に従う	不要	飛沫感染・接触感染
伝染性紅斑(りんご病)	7～14日	病状により医師の指示による	不要	飛沫感染 発疹出現前1週間
溶連菌感染症	1～3日	主症状が消失するまで	不要	飛沫感染・接触感染 有効治療開始後1～2日
インフルエンザ	1～2日	主要症状消失後2日を経過するまで	提出	飛沫感染 発病後3～4日
ロタウイルス(冬期下痢症)	1～4日	医師の指示に従う	不要	経口感染
ノロウイルス	1～2日	医師の指示に従う	不要	接触感染
とびひ(伝染性膿痂疹)	4～6日	病状により医師の指示による	提出	おできの浸出液で皮膚にとびひする
流行性角結膜炎	4～7日	充血がとれ目ヤニがなくなるまで	提出	接触感染・プール媒介感染 発病後2～3週
咽頭結膜熱(プール熱)	5～7日	充血がとれ目ヤニがなくなるまで	提出	経口感染・接触感染 潜伏期の後半～急性期の間
急性出血性結膜炎	1～2日	治癒するまで	提出	接触感染 発病後4～5日